



## PROGRAMA CONTROL DEL EMBARAZO

Grupo	Problema de salud	Examen	Frecuencia	Método	Acceso
Embarazadas	Control médico y de matrona	<p><b>Intervención de Médico:</b> 1er y 8vo mes  <b>Intervención de Matrona:</b> inicio del control previo a las 12 semanas de amenorrea, con medición de peso y talla, presión arterial, cuestionario AUDIT, aplicación instrumento 5A's.</p> <p><b>Derivación para realización de:</b> grupo sanguíneo y Rh, hemoglobina y hematocrito, VDRL o RPR en sangre, glicemia en ayunas, orina completa, urocultivo y ecografía precoz (antes de las 20 semanas).</p> <p><b>Deben repetirse los siguientes exámenes:</b> VDRL a las 28 semanas, Glicemia o PTG entre 24 y 28 semanas, Hematocrito y Hemoglobina entre 28 y 32 semanas.</p>	3 veces durante el embarazo	<p>Medición peso y talla  Medición presión arterial  Cuestionario AUDIT e instrumento 5A's  Examen sangre venosa  Urocultivo  Ecografía</p>	Orden médica
	Diabetes Mellitus gestacional	Glicemia en ayunas de al menos 8 horas	Primer control de embarazo, idealmente previo a las 13 semanas de gestación	Examen sangre venosa	Orden médica
	Infección por Virus de Inmunodeficiencia Humana	Test Elisa en sangre	Una vez durante el embarazo, a contar del primer trimestre	Examen sangre venosa	Orden médica
	Sífilis	VDRL en sangre	Una vez durante el embarazo, a contar del primer trimestre	Examen sangre venosa	Orden médica
	Infección urinaria	Urocultivo	Una vez durante el embarazo, a contar del primer trimestre	Urocultivo	Orden médica
	Sobrepeso y Obesidad	Medición del peso y talla. Asesoría sobre hábitos saludables de alimentación y actividad física	Primer control de embarazo, idealmente previo a las 13 semanas de gestación	Medición del peso y talla, determinación de IMC	Control médico
	Hipertensión Arterial	Medición estandarizada de la presión arterial	Primer control de embarazo, idealmente previo a las 13 semanas de gestación	Técnica indirecta de medición de la presión arterial	Control médico
	Beber problema	Cuestionario de Autodiagnóstico sobre Riesgos en el Uso de Alcohol (AUDIT)	Primer control de embarazo, idealmente previo a las 13 semanas de gestación	Cuestionario AUDIT auto aplicado	Control médico
	Tabaquismo	Aplicación del instrumento Estrategia 5A's según guía clínica.	Primer control de embarazo, idealmente previo a las 13 semanas de gestación	Aplicación del instrumento Estrategia 5A's según guía clínica	Control médico